Важность генетических исследований для понимания структуры, функции и адаптации лесных биогеоценозов и для менеджмента сибирских бореальных лесов

Константин Валерьевич Крутовский

*Внс лаборатории популяционной генетики
Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН*

*Научный руководитель Научно-образовательного центра
геномных исследований и лаборатории лесной геномики
Сибирского федерального университета*

*Профессор генетики отделения лесной генетики и селекции
Гёттинггенского университета, Германия*

*Адъюнкт профессор отделения по изучению и управлению
экосистем Техасского агро-механический университета, США*

Биогеоценоз

- **Биогеоценоз** (от греч. βίος — жизнь γη — земля + κοινός — общий) — природная саморегулирующаяся устойчивая система, включающая сообщество живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды (животные, растения) и неорганических факторов (вода, почва) в пределах одной территории, связанных между собой круговоротом веществ и потоком энергии. Примеры: сосновый лес, горная долина. Учение о биогеоценозе разработано Владимиром Сукачёвым в 1942 году.
- В зарубежной литературе — малоупотребимо и вместо этого обычно используется понятие **природная экосистема**, т.е. система, состоящая из взаимосвязанных между собой сообществ организмов разных видов и среды их обитания (термин был введен в 1935 г. английским ботаником А. Тенсли).
- **Экосистема** — более широкое понятие, относящееся к любой подобной системе. **Биогеоценоз**, в свою очередь — класс экосистем, экосистема, занимающая определенный участок суши и включающая основные компоненты среды — почву, растительный покров и атмосферу. (Например, большинство искусственных и морских экосистем не являются биогеоценозами).
- Таким образом, каждый биогеоценоз — это экосистема, но не каждая экосистема — биогеоценоз.

Биогеоценоз

- Определение биогеоценоза по В.Н. Сукачеву (Основы лесной биогеоценологии, М. : Наука, 1964: стр. 23) считается классическим – «... это совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющая особую специфику взаимодействий этих слагающих ее компонентов и определенный тип обмена веществ и энергией: между собой и с другими явлениями природы и представляющая собой внутреннее противоречивое единство, находящееся в постоянном движении и развитии ...».
- В этом определении отражаются все сути биогеоценоза, черты и особенности, присущие только ему:
 - ✓ биогеоценоз должен быть однородным по всем параметрам: живого и неживого вещества: растительности, животному миру, почвенному населению, рельефу, почвообразующей породе, свойствам почвы, глубине и режимам грунтовых вод;
 - ✓ каждому биогеоценозу присуще наличие особого, только ему присущего типа обмена веществ и энергии;
 - ✓ всем компонентам биогеоценоза свойственно единство жизни и ее среды, т.е. особенности и закономерности жизнедеятельности биогеоценоза определяются средой его обитания, таким образом, биогеоценоз представляет собой географическое понятие.
- Каждый конкретный биогеоценоз также должен:
 - быть однородным по своей истории;
 - быть достаточно долговременным сложившимся образованием;
 - ясно отличаться по растительности от соседних биогеоценозов и эти отличия должны быть закономерными и экологически объяснимыми.

Биогеоценоз

Рис. 1. Схема взаимодействий компонентов биогеоценоза

Важность лесных биогеоценозов

- Самые сложные и важные природные биогеоценозы – лесные.
- Лес представляет собой наиболее мощную «пленку жизни». Лесам принадлежит доминирующая роль в сложении растительного покрова Земли. Они покрывают почти третью часть суши планеты – 3,9 млрд. га. Из остальной части почти половину занимают пустыни, полупустыни и тундры около 3,8 млрд. га, а более 1 млрд. га приходится на бросовые, застроенные и другие непродуктивные земли.
- Масса органического вещества, сосредоточенного в лесах, составляет 10^{17} – 10^{18} т, что в 5–10 раз превышает массу всей травянистой растительности.
- Именно поэтому особое значение придавалось и придается биогеоценологическим исследованиям лесных систем и термин «биогеоценоз» был предложен академиком В.Н. Сукачевым в конце 30-х гг. 20 в. применительно к лесным экосистемам. Но оно правомерно по отношению к любой природной экосистеме в любом географическом районе Земли.

Важность лесных биогеоценозов

- Лес – один из богатейших и важнейших мировых природных ресурсов.
- Леса Российской Федерации (РФ) являются одними из важнейших национальных природных ресурсов и её гордостью. Общая площадь лесов составляет свыше 809 млн. га, или 20-25% от общей площади лесов мира (ФАО: Глобальная оценка лесных ресурсов 2011; <http://www.fao.org/docrep/013/i2000e/i2000e.pdf>).
- Большую часть из них преимущественно составляют естественные леса.
- Леса России играют исключительно важную роль в сохранении биоразнообразия умеренных и бореальных областей Евразии.
- Леса РФ по преимуществу бореальные: их площадь занимает 88% площади лесопокрытых земель.
- В РФ сосредоточено около 63% (760 млн. га) площади всех бореальных лесов мира (1214 млн. га по оценкам ФАО).
- **Бореальные леса РФ играют важнейшую роль в регуляции климата всей планеты, и их изучение сейчас, в условиях глобального изменения климата, актуально как никогда (катастрофическое сокращение лесов!)**

Важность и уникальность хвойных биогеоценозов

- **Хвойные виды** семейства сосновых (*Pinaceae*: роды, встречающиеся в РФ – *Pinus*, *Picea*, *Abies*, *Larix*) являются **основными бореальными** лесообразующими породами РФ
- **Уникальная репродуктивная система** (гаплоидный мегагаметофит, имеющий гаметическое происхождение и идентичный яйцеклетке гаплотип)
- **Им принадлежат практически почти все биологические рекорды:**
 - продолжительность жизни до 5 тыс. лет (*Pinus longaeva*)
 - размеры особей (высота *Sequoia sempervirens* свыше 110 м и масса *Sequoiadendron giganteum* свыше 1400 т)
 - размер генома (в 4-9 раз больше генома человека)
- **Наиболее экономически выгодные и источник уникальных продуктов для:**
 - строительной, бумажной и мебельной промышленности
 - получения альтернативной энергии и биотоплива (спирт на основе целлюлозы)
 - медицины (например, противоопухолевые препараты на основе таксола)
 - авиационной и ракетной техники (высококачественное реактивное топливо на основе альфа-пиренов)
 - борьбы с вредителями (экологически безопасные пестициды и репелленты на основе терпенов и др. вторичных метаболитов)

Важность популяционной генетики для изучения лесных биогеоценозов

- Ключевыми (системообразующими) организмами лесных биогеоценозов – являются **древесные виды**, которые состоят из **популяций**, очень часто с **высокой внутривидовой и межвидовой изменчивостью**
- **Популяционная генетика**, или **генетика популяций** позволяет изучать эту изменчивость:
 - раздел генетики, изучающий распределение частот аллелей и их изменение под влиянием движущих сил эволюции: мутагенеза, естественного отбора, дрейфа генов и миграция;
 - изучает и принимает во внимание субпопуляционные структуры, пространственную и временную структуру популяции;
 - пытается объяснить процессы адаптации и видообразования и является одной из основных составляющих синтетической теории эволюции (= синтез эволюционного учения Дарвина и генетики, приведший к формированию математической основы популяционной генетики);
 - широко использует молекулярно-генетические маркёры

Важность изучения популяций

- **Популяция** (от [лат. populatio](#) — население) — это совокупность организмов одного [вида](#), длительное время обитающих на одной территории (занимающих определённый [ареал](#)). Этот термин используется в различных разделах биологии, [экологии](#), [демографии](#), [медицине](#) и [психометрике](#).
- В **экологии и эволюционной теории популяция** — совокупность особей одного вида, обладающая общим [генофондом](#), способная к более-менее устойчивому самовоспроизводству (как половому, посредством [панмиксии](#) в идеальном случае, так и бесполому), [относительно обособленная](#) (географически или репродуктивно) от других групп, с представителями которых (при половой репродукции) потенциально возможен [генетический](#) обмен.
- С точки зрения [популяционной генетики](#), **популяция** — это группа особей, в пределах которой вероятность скрещивания во много раз превосходит вероятность скрещивания с представителями других подобных групп. Обычно говорят о популяциях как о группах в составе [вида](#) или [подвида](#).
- **Популяция** — элементарная единица эволюции.
- Термин **популяция** введён [Вильгельм Иогансен](#)ом в 1903 г., однако уже [Чарлз Дарвин](#) объяснял эволюцию видов изменчивостью и конкуренцией групп особей.

Важно понимать основы генетики

- **Генéтика** (от греч. γενητως — порождающий, происходящий от кого-то) — наука о закономерностях наследственности и изменчивости.
- **В основе всей наблюдаемой нами фенотипической изменчивости** (морфологической, физиологической и биохимической) живых организмов в биогеоценозе лежит **изменчивость на уровне ДНК** (носителя генетической информации) и **влияние среды во взаимодействии с генотипом**.
- Чтобы понять фенотипическую изменчивость и как она влияет на эволюцию организмов и их адаптацию к определенной среде надо знать связь между этой фенотипической изменчивостью и генетической.
- Большинство организмов в биогеоценозе представлены в той или иной степени генетически различающимися популяциями; т.е. генетическая изменчивость вида определённным образом организована и структурирована в пространсте, образуя популяционно-генетическую структуру вида.

Аналогия между генетической и языковой передачей информации

Нуклеотид

Буква алфавита

Триплет

Слово

Ген

Строчка в тексте/Предложение

Хромосома

Глава

Геном

Генофонд

N	U	C	A	G	S
U	UUU	UUC	UUA	UUG	U
C	UUU	UUC	UUA	UUG	C
A	UUU	UUC	UUA	UUG	A
G	UUU	UUC	UUA	UUG	G

Важность использования генетических маркёров

Вся история генетики связана с развитием и использованием генетических маркёров:

- начиная с **Грегора Менделя** (Gregor Mendel, 1822-1884) - морфологические маркёры семян гороха (цвет, форма) – законы наследования моногенных признаков

- и **Томаса Моргана** (Thomas Morgan, 1866-1945) - морфологические маркёры дрозофилы – генетическое сцепление, генетические карты, хромосомная теория и т.д.

- и заканчивая функциональными маркёрами (ESTP, SNPs и т.д.)

Важность молекулярно-генетических маркёров

Молекулярно-генетические маркёр или ДНК-маркёр:

- признак, выявляемый методами [молекулярной биологии](#) и отражающий изменчивость на уровне [нуклеотидной](#) последовательности [ДНК](#) для определенного [гена](#) или для любого другого участка [хромосомы](#) при сравнении различных генотипов особей, пород, сортов, линий, популяций;
- изучаются на уровне белков, [ДНК](#) и [РНК](#);
- эффективно используются для решения многих задач генетики, селекции, сохранения биоразнообразия, изучения механизмов эволюции, картирования хромосом, а также для семеноводства и племенного дела;
- условно можно подразделить на следующие три типа:
 - «селективно-нейтральные» маркеры некодирующих участков
 - «функциональные» маркеры участков структурных генов, кодирующих аминокислотные последовательности белков ([электрофоретические варианты белков](#)) и регуляторных генов
 - «анонимные» маркеры участков различных последовательностей ДНК, отношение которых к структурным генам, как правило, неизвестно.

Задачи, решаемые с помощью генетических маркёров

- наследование и картирование генетических признаков
- построение генетических и физических карт
- популяционно-генетическая структура, уровни изменчивости и генетическая дифференциация
- система скрещивания
- поток генов, обмен генами, интрогрессивная гибридизация
- судебно-медицинская экспертиза, генетическая идентификация
- молекулярная филогения и систематика
- **ассоциация генетической изменчивости с фенотипической**
- **Marker-aided selection и геномная селекция**

Из всей изменчивости нас большего всего интересует адаптивная генетическая изменчивость - Почему?

- ПОНЯТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
- ПРДСКАЗАТЬ ЭФФЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
- ПРОТИВОСТОЯТЬ ЭТИМ ЭФФЕКТАМ ПУТЁМ СЕЛЕКЦИИ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫХ ДЕРЕВЕА И ДЛЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО И ОБОСНОВАННОГО ПЕРЕНОСА И ИНТРОДУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА (assisted migration)
- ПОНЯТЬ **ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ОТВЕТ** И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

Важность геномики

- Эволюционный ответ это генетическая адаптация через генетическое изменение, которое увеличивает приспособленность растений и животных к их среде обитания, включая биотические и абиотические взаимодействия
- множественные гены обычно вовлечены в генетическую адаптацию, таким образом их изучение требует применения геномных методов и полногеномных подходов

Как измерить адаптивную генетическую изменчивость в популяциях?

• Традиционные методы

- географические культуры
- молекулярно-генетические маркеры
- картирование генов количественных признаков, или Quantitative Trait Locus (QTL)-картирование

• Современные популяционно-геномные подходы

- новый тип функциональных геномных маркеров
- ассоциативное картирование
- обнаружение генов или генетических элементов с необычно высокими или низкими уровнями изменчивости и дифференциации, выпадающими из общего распределения генетической изменчивости и дифференциации (так называемые **гены-аутсайдеры** или **outliers**)

• Интеграционный подход

Nature vs. Nurture

Как их разделить?

Пример:

Высотный градиент

Географическая культура

Генотип

Среда

$G \times C$

Её можно решить для сложных признаков только изучая изменчивость по совокупности всех генов в геноме

Nature (genome) vs. Nurture (environment)

$$P = G + E + G \times E$$

Phenotype = Genome (Genotype) + Environment + Interaction

Organisms are different because of the:

- **genomic/genetic (G) differences among individuals**
- **different environments (E) where individuals are growing**
- **and interactions between the **genotypes** and the **environments** in which they grow ($G \times E$)**

Nature (genome) vs. Nurture (environment)

Сколько генотипа в фенотипе?

Mendelian traits vs. Complex traits

- **Mendelian = Qualitative**
 - single gene responsible for most of the observed phenotypic variance
- **Complex = Quantitative**
 - multiple genes with gene $\times$ gene, gene $\times$ environment interactions contributing to phenotypic variance

Single vs. Multiple Genes in Population

$$P^n = G^n + E^n + G^n \times E^n$$

n – multiple phenotypes, genes and environments

Great Ferma Theorem : $Z^n = X^n + Y^n$

does not have integer solutions X, Y, Z for $n > 2$

Andrew Wiles, 1994

My Theorem : $P^z = G^x + E^y$

My Great Theorem: $P^z = G^x + E^y + G^x \times E^y$

Геномика – единственное решение!

Expression of genetic variation

Linking **Genotype** to **Phenotype** & **Environment**

Quantitative Genetics:

- phenotyping
- heritability (G x E)
- trait correlations

Structural Genomics:

- sequencing
- marker development
- linkage, physical and QTL mapping

Population Genomics:

- outliers
- neutrality tests
- candidate gene, allele, SNP association mapping

Ecological Genomics:

- clinal variation
- association with geographic factors and environmental variables

Как связать сложную фенотипическую изменчивость с генетической?

Современные подходы в популяционной, ландшафтной и экологической геномике:

- изучение связи генетической изменчивости по большому числу маркёров с фенотипической и средовой изменчивостью (т.н., **ассоциативное картирование**)
- обнаружение генов-«аутсайдеров» (outliers) путём сравнение параметров изменчивости и дифференциации по селективно-нейтральным и функциональным геномным маркерам

Крутовский К.В. 2006. От популяционной генетики к популяционной геномике лесных древесных видов: интегрированный популяционно-геномный подход. *Генетика* Т. 42. №10. С. 1304–1318.

González-Martínez S.C., Krutovsky K.V., Neale D.B. 2006. Forest tree population genomics and adaptive evolution. *New Phytologist* **170**(2): 227-238.

Ассоциативное картирование

Полно-геномное ассоциативное картирование с использованием случайных маркёров (например, «снипов» - SNPs – single nucleotide polymorphisms)

vs.

Избирательного ассоциативного картирования, основанного на функциональных маркёрах в генах-кандидатах

Неравновесие по сцеплению (Linkage Disequilibrium - LD) – это неслучайная ассоциация аллелей сцепленных локусов

Association Mapping Components

- **Phenotypes**
 - trait values
- **Numerous Molecular Markers**
 - SNPs
 - ✓ SNP genotyping assays based on preselected SNPs
 - ✓ SNP genotyping by sequencing
- **Statistical Models**
 - Linear model: phenotype as response and genotype as predictor

Геномика адаптивных признаков хвойных

Время раскрытия почки

Вторичное прорастание

Повреждение почек, хвои и стебля заморозками

Время закладки почки

Засухоустойчивость

Проекты по популяционной, ландшафтной и экологической геномике ладанной сосны (*Pinus taeda* - Loblolly pine)

- USDA NRICGP Plant Genome Program / National Institute of Food and Agriculture (NIFA) Agriculture and Food Research Initiative (AFRI) Competitive Grants Program, Applied Plant Genetics Coordinated Agricultural Project (CAP), #CA-D-PLS-2038-CG, PI: D. B. Neale (dendrome.ucdavis.edu/ctgn/people), 2004-2011, \$6,000,000; “Conifer Translational Genomics Network” (CTGN)
- USDA NIFA AFRI Competitive Grants Program, CAP, Climate Change Program 1: Regional Approaches to Climate Change, Program Area Code – A3101, #2011-68002-30185, PI: Timothy Martin (www.pinemap.org/about/team-members), 5 years, 2011-2016, \$19,976,825; “Integrating research, education and extension for enhancing southern pine climate change mitigation and adaptation” (PINEMAP)

Ареал ладанной сосны

Conifer Translational Genomics Network (CTGN)

- CTGN много институтский Координируемый с.-х. проект (Coordinated Agricultural Project - CAP) финансируемый USDA и US Forest Service

- Основная задача: применение экспериментальных геномных ресурсов и средств в практической лесной селекции

www.pinegenome.org/ctgn

- Подходы:

- масштабное генотипирование элитных селекционных популяций ладанной сосны и дуглассии
- обнаружение и подтверждение ассоциаций между генетическим маркёрами и фенотипическими признаками
- моделирование, разработка и внедрение оптимальных методов включения маркёров в селекционные программы геномной селекции

CTGN: Linking Genotype to Phenotype & Environment

Quantitative Genetics:

- phenotyping
- heritability ($G \times E$)
- trait correlations

Structural Genomics:

- high-throughput sequencing
- marker development
- linkage, physical and QTL mapping

Population Genomics:

- outliers
- neutrality tests
- candidate gene, allele, SNP association mapping

Ecological Genomics:

- clinal variation
- association with geographic factors and environmental variables

Секвенирование и генотипирование SNP

NSF Allele Discovery of Economic Pine Traits 2 (ADEPT2)

resequencing & SNP discovery project, \$6 mln

- ~23,000 SNPs обнаружено в ~7,900 частично амплифицированных и секвенированных уникальных генах в небольшой популяционной выборке и ~7000 из них были использованы для создания Illumina Infinium платформы для последующего генотипирования в разных CTGN популяциях

USDA Conifer Translational Genomics Network (CTGN) project, \$6 mln

5,379 SNPs были генотипированы в >4500 trees из нескольких селекционных популяций для ассоциативного картирования, используя Illumina Infinium платформу;

4,264 SNPs были полиморфны в популяциях Восточного Техаса

Экозоны Техаса

Legend

Counties

Texas Ecoregions:

- Blackland Prairies
- Eastern Cross Timbers
- Edwards Plateau
- Grand Prairie and Plains
- High Plains
- Mountain Forest
- Pineywoods**
- Post Oak Savannah**
- Rolling Plains
- South Texas Plains
- Trans Pecos
- Western Cross Timbers
- Western Gulf Coastal Plain

State & National Forests

Texas has **60 million acres** of forestland
- more than any other state in the lower 48 United States

<http://txforestservation.tamu.edu/main/popup.aspx?id=7002>

EVERYTHING IS BIGGER AND BETTER IN TEXAS — EVEN THE FORESTS

Популяции ладанной сосны в Восточном Техасе и изученные параметры

14 populations of the 1st generation selection

8 populations of the 2nd generation selection

30 breeding groups

4,264 SNPs / >1,700 trees

+

Phenotypes: *DBH, height, volume, etc.*
Environmental variables: *t, prec., arid.*

- Genetic diversity: H_e , F_{IS} , etc.
- Genetic differentiation index: F_{ST}
- Selection detection via search for F_{ST} outliers
- Population structure inference using STRUCTURE & ΔK
- Association mapping & functional annotation of significant SNPs
- Genome wide LD

Изученные популяции ладанной сосны в Восточном Техасе

Географическое происхождение селекционных популяций 1-ого поколения (Восточный Техас)

Генетическая дифференциация (F_{ST}) 4,264 SNPs в популяциях 1-ого поколения селекции

**Очень низкая
дифференциация;
балансирующий или
стабилизирующий отбор?**

**Очень высокая
дифференциация;
позитивный или
дивергентный отбор?**

Поиск «outlier» SNPs, находящихся под действием отбора и селективно-нейтральных маркёров с помощью коалесцентного моделирования

Распределение F_{ST} и гетерозиготности (H_e) для 4,264 SNPs в популяциях 1-ого поколения селекции, 95К циклов моделирования для обнаружения порога

Beaumont *et al.* (1996) Royal Soc. B; Antao *et al.* (2008) Bioinformatics

F_{ST} «outliers»

Примеры генов-кандидатов, изменчивость которых вероятно находится под влиянием отбора (after correction for false positive):

Балансирующий отбор (244):

Arabinofuranodisase, Glycoprotease protein, Dehydrin, Lipoxygenase, Cytokinin oxidase, Transmembrane transporters, Endoglucanase, MYB transcription factor, *Pinus taeda* Heme oxygenase I, etc.

Dirigent protein, Homeobox-leucine zipper, Cytochrome p450, *Gras* transcription factor, *Gigantia* protein, Ethylene-forming enzymes Histone H4, Reductases, etc.

Направленный отбор (74):

Geranyldiphosphate, Disease resistance proteins, Arabinogalactan-like proteins, *Pinus* Expansin, *Pinus* alpha-Xyloxidase, etc.

Potassium/proton antiporter, Laccase 90D Protein kinases, Histone H3.2, etc.

Chhatre V, Byram T, Neale DB, Wegrzyn JL, Krutovsky KV (2013) Genetic structure and association mapping of adaptive and selective traits in the East Texas loblolly pine (*Pinus taeda* L.) breeding populations. *Tree Genetics and Genomes* 9: 1161-1178

Ассоциативное картирование SNPs и фенотипической изменчивости в адаптивных и селективных признаках (таких как скорость роста, плотность древесины, устойчивость к заболеваниям и засухе, и т.д.)

Значимые ассоциации были обнаружены, например, для:

- Arabinofuranosidase
- Xylosidase
- Protein kinases
- Chloroplast proteins
- Metallothionein-like protein
- Chlorophyll binding protein
- Glucuronase 4-epimerase
- Clavata-like receptor
- RNA polymerases
- Decarboxylases
- Sodium symporter family protein
- Acyl CoA synthetase
- Tubulin beta-chains
- NBS disease resist. protein - P. taeda Transmembrane protein
- Universal stress protein
- Cyclin-D like protein
- cdc2 protein kinases
- Synaptotagmins etc.

Chhatre et al. 2013 Tree Genetics and Genomes 9: 1161-1178

Клиальная изменчивость и ассоциация с изменчивостью средовых факторов: Логистическая регрессия (LR)

Number of SNPs genotyped in 463 trees from 27 populations in East Texas:

- total = **5379**
- polymorphic = **4264**
- used for LR = **3667**

Clinal variation - significant correlation with:

- Latitude = **210**
- Longitude = **293**
- both latitude and longitude = **34**

Environmental variables- significant correlation with:

- Monthly mean total annual temperature above 5°C or Growing Degree Days (MEAN_annGDD5)* = **245**
- Mean Annual Precipitation (MEAN_annP)** = **268**
- Mean Annual Temperature (MEAN_MAT)*** = **259**
- Aridity index = *in progress*

Chhatre *et al.* 2014 *Molecular Ecology* (in prep.)

Клиальная изменчивость: Логистическая регрессия (LR)

Significant association of the A/G alleles of the CL4404Contig1-01-155 SNP with Latitude:

Whole Model Test

Model	-LogLikelihood	DF	ChiSquare	Prob>ChiSq
Difference	4.42624	1	8.85247	0.0029*

Insignificant association of the A/G alleles of the 0-16206-01-114 SNP with Latitude:

Whole Model Test

Model	-LogLikelihood	DF	ChiSquare	Prob>ChiSq
Difference	0.00239	1	0.004776	0.9449

Ассоциация с изменчивостью средовых факторов: Логистическая регрессия (LR)

Logistic Fit of CL1757Contig1-01-187 By MEAN_annGDD5

Whole Model Test

Model	-LogLikelihood	DF	ChiSquare	Prob>ChiSq
Difference	5.44054	1	10.88108	0.0010*

Logistic Fit of 0-2039-01-580 By MEAN_annP

Whole Model Test

Model	-LogLikelihood	DF	ChiSquare	Prob>ChiSq
Difference	6.76393	1	13.52786	0.0002*

Logistic Fit of 0-18644-02-706 By MEAN_MAT

Whole Model Test

Model	-LogLikelihood	DF	ChiSquare	Prob>ChiSq
Difference	6.40695	1	12.81391	0.0003*

Logistic Fit of CL1209Contig1-02-121 By MEAN_annP

Whole Model Test

Model	-LogLikelihood	DF	ChiSquare	Prob>ChiSq
Difference	7.23560	1	14.47121	0.0001*

СТГН: Результаты изучения популяционной, ландшафтной и экологической геномики ладанной сосны (*Pinus taeda* L.)

- SNPs from >5000 genes were genotyped in >4500 trees sampled from numerous natural and breeding populations covering the full-range of the species
- Significant associations were found between adaptive trait phenotypes, geographic and environmental variables (temperature, growing degree-days, precipitation and aridity) and a diverse sets of genes including abiotic stress response genes ranging from trans-membrane proteins to proteins involved in sugar metabolism and transcription factors
- Numerous genes under selection were found (outliers)
- Multiple allele candidates for local adaptation were discovered

Eckert *et al.* 2010 *Genetics* 185: 969–982

Eckert *et al.* 2010 *Molecular Ecology* 19: 3789–3805

Chhatre *et al.* 2013 *Tree Genetics and Genomes* 9: 1161-1178

Chhatre *et al.* 2014 *Molecular Ecology* (in prep.)

USDA NIFA Climate Change Program 1: Regional Approaches to Climate Change PI: Timothy Martin, 2011-2016, \$19,976,825; “Integrating research, education and extension for enhancing southern pine climate change mitigation and adaptation”.

ESSM Team of Scientists

Drs. Tom Byram, Carol Loopstra and Kostya Krutovsky will be the genetics team from Texas A&M University.

Among this project's main objectives are the study of loblolly pine's genetic adaptation to potential climate change. The goal is to use this knowledge to develop a new seed deployment tool that will help mitigate the detrimental effects of warmer and drier climate in the southeastern United States. Association and population genetics analysis will be used to characterize important adaptation and mitigation traits to support future breeding efforts. The genetics program will support development of growth and yield models, stand-level biophysical carbon balance modeling, multi-scale policy and economic analysis of market and non-market forest benefits and services, and an education program to deliver state-of-the-art forest management solutions. Texas A&M will assist collaborators at sister organizations in meeting these objectives through a local genetics team.

\$20 million grant to study effects of climate change <http://www.pinemap.org>

Six scientists from Ecosystem Science and Management will be part of a \$20 million grant to study effects of climate change on agricultural and forest production

On Friday, Feb. 18, the USDA National Institute of Food and Agriculture (NIFA) awarded three Coordinated Agriculture Projects (CAP) representing a major scientific investment in studying the effects of climate change on agriculture and forest production. NIFA Director Roger Beachy made the announcement at the annual meeting of the American Association for the Advancement of Science in Washington, D.C.

"Climate change has already had an impact on agriculture production. Going forward agriculture producers need sound scientific information to plan and make decisions to ensure their economic viability," Beachy said. "These projects ensure we have the best available tools to accurately measure the effects of climate change on agriculture, develop effective methods to sustain productivity in a changing environment and pass these resources on to the farmers and industry professionals who can put the research into practice."

Institute of Food and Agriculture announced the award of a five-year, \$20 million grant, to fund research, outreach and education to develop and transfer better management methods for southern pine, notably loblolly pine. They will study climate change mitigation and adaptation as it relates to southern pines, particularly loblolly pine, which comprises 80 percent of the planted forestland in the Southeast. It's widely used for lumber, pulp and paper production, and has great potential for biofuel production.

NIFA made the awards through its Agriculture and Food Research Initiative funding opportunity. AFRI's Climate Change challenge area is focused on reducing greenhouse gas emissions and increasing carbon sequestration in agricultural and forest production systems and preparing the nation's agriculture and forests to adapt to changing climates.

Two-thirds of all the drinking water in the U.S. comes from forested watersheds.

PINEMAP проект: Генетика и селекция

Основные цели:

- Обнаружение адаптивной генетической изменчивости через ассоциативное картирование и генотипирование секвенированием (genotyping-by-sequencing - GBS) и использование полученных данных для лесохозяйствования и геномной селекции ладанной сосны

Полногеномное GBS пока невозможно и необходимо избирательное секвенирование

United States Department of Agriculture
National Institute of Food and Agriculture

www.pinemap.org

РІNЕМАР проект:

избирательное секвенирование ладанной сосны (*Pinus taeda* L.) для генотипирования

1. Restriction-enzyme-based double digest Restriction site-Associated DNA Sequencing (RAD-Seq) using Illumina Hiseq2000 (R. Whetten, F. Isik: the North Carolina State University Cooperative Tree Improvement Program will genotype the Plantation Selection Seed Source Study (PSSSS) association mapping population planted across the region from four different coastal provenances).
2. Single Digest Restriction site-Associated DNA Sequencing (RAD-Seq) using Illumina Hiseq2000 (G. Peter: the Cooperative Forest Genetics Research Program at the University of Florida will genotype the Comparing Clonal Lines ON Experimental Sites (CCLONES) association mapping population).
3. In solution hybridization-capture based Agilent SureSelect Target Enrichment followed by Illumina Hiseq2000 sequencing (K. V. Krutovsky, C. Loopstra, T. Byram: the Western Gulf Forest Tree Improvement Program at Texas A&M University and Texas Forest Service will genotype the Allele Discovery of Economic Pine Traits2 (ADEPT2) association mapping population for the western region; Dr. Jason Holiday: Virginia Tech).

PINEMAP проект: Генетика и селекция

1. Ross Whetten, Fikret Isik, Steve McKeand: the North Carolina State University Cooperative Tree Improvement Program will genotype the **Plantation Selection Seed Source Study (PSSSS) association mapping population** planted across the region from four different coastal provenances ("1" in map).
2. Gary Peter, John Davis: the Cooperative Forest Genetics Research Program at the University of Florida will genotype the **Comparing Clonal Lines ON Experimental Sites (CCLONES) association mapping population** ("2" in map).
3. Kostya Krutovsky, Carol Loopstra, Tom Byram: the Western Gulf Forest Tree Improvement Program at Texas A&M University and Texas Forest Service will genotype the **Allele Discovery of Economic Pine Traits2 (ADEPT2) association mapping population** for the western region ("3" in the map)

Обогащение экзомной ДНК с помощью Agilent's SureSelect Target Enrichment System для последующего генотипирования через секвенирование (genotyping by sequencing - GBS) с помощью NGS

SureSelect^{XT2} NGS Target Enrichment Workflow

• Our library contained **647,634 baits** (2X coverage) representing **35,386** out of total **35,550** unigenes available at PineDB*

• Capture target size $\approx$ 78 Mb (2n)

Figure 1 Overall sequencing sample preparation workflow.

Figure 2 SureSelect Target Enrichment System Capture Process

* <http://bioinfolab.muohio.edu/txid3352v1>

<http://www.chem.agilent.com/library/usermanuals/Public/G9630-90000.pdf>

Обогащение экзомной ДНК 35,386 генов в ладанной сосне с помощью Agilent's SureSelect Target Enrichment System для последующего «штрих-кодирования» индивидуальных образцов и секвенирования в популяционных пулах

647,634 олигонуклеотидных проб длиной в 120 bp каждая были разработаны с помощью Agilent Genomic Workbench software на основе 35,386 юнигенов (сгенерированных Dr. Chun Liang, Miami University; PineDB v.1 bioinfolab.muohio.edu/txid3352v1), синтезированы и использованы для гибридизации с 78 Мб экзона для обогащения ДНК-х библиотек экзонами и последующего секвенирования на Illumina HiSeq2000

Пример 113 проб, покрывающих юниген #14

SNP маркёры, обнаруженные с помощью SAMtools и только в уникально картированных прочтениях (reads) Illumina HiSeq2000

Образцов на пул	Обнаруженных SNP	Уровень разнообразия SNP, π
2	1,905,814	0.0026
4	1,870,997	0.0061
8	1,816,724	0.0050

Mapping criteria for SAMtools and Freebayes: minimum read depth = 10, at least 30% of total uniquely mapped reads contain an alternate allele

USDA NIFA Climate Change Program 1: Regional Approaches to Climate Change Project: “Integrating research, education and extension for enhancing southern pine climate change mitigation and adaptation” <http://www.pinemap.org>

- **2,8 млн SNPs уже генотипировано в почти 40,000 генах ладанной сосны в моей лаборатории в Texas A&M University в этом проекте путём прямого секвенирования геномной ДНК, обогащённой экзомными районами с помощью гибридизации тотальной ДНК с 600 млн олигонуклетидных проб, представляющих почти полный транскриптом (~40 тыс. экспрессируемых генов) ладанной сосны**
- **более чем 400 деревьях со всего ареала, профенотипированных по большому числу адаптивных и селекционно-ценных признаков, а также изученных по большому числу средовых факторов будут генотипированы по всем обнаруженным SNPs для обнаружения аллелей и гаплотипов связанных с изменчивостью адаптивных признаков, а также с устойчивостью к средовым факторам**
- фактически, это означает **переход от отдельных маркёров к полному генотипированию через секвенирование!**
- **эра маркёров заканчивается – наступает эра полногеномного секвенирования!**
- **популяционная геномика вместе с молекулярной экологией (экогеномикой) позволяют:**
 - обнаружить гены и аллели ответственные за адаптацию
 - связать генотипы с адаптивными фенотипами и средой

**Геномная селекция
генетически-улучшенных
пород животных и
растений, в том числе
древесных, устойчивых
также к экстремальным
факторам среды**

Традиционный цикл селекции сосны > 26 лет

Ускоренный цикл селекции сосны > 13 лет

(Adapted from Matias Kirst)

Геномная селекция

Training population

Breeding population

1st cycle of early MAS

2nd cycle of MAS

Традиционный цикл селекции сосны

Ускоренный цикл селекции сосны

Геномная селекция

Genomic Selection Guided Crosses

“Surgical” breeding

(Adapted from Matias Kirst)

Современные методы секвенирования ДНК

- Выпуск с 2005 г. коммерческих высокопроизводительных секвенаторов ДНК на основе новых технологий массивного параллельного секвенирования компаниями Roche и Illumina
- Создание в 2012 г. Научно-образовательного центра геномных исследований Сибирского федерального университета при поддержке Отдела генетики и селекции Центра защиты леса Красноярского края и Лаборатории лесной генетики и селекции Института леса им. В. Н. Сукачева СОРАН (<http://genome.sfu-kras.ru>) оборудованного самым производительным секвенатором Illumina HiSeq 2000 и суперкомпьютером

Руководство | НОЦ «Центр геномных исследований»

genome.sfu-kras.ru/leadership

Центр геномных исследований
Научно-образовательный центр СФУ

Новости
Главная
Руководство
Структура
Партнеры
Контакты
СМИ о нас

Руководство
Руководство Научно-образовательного центра геномных исследований

Научный руководитель Центра
Крутовский Константин Валерьевич, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской Академии Наук, профессор Техасского агро-механического университета (США) и Геттингенского университета (Германия).
Адрес: 119991, ГСП-1, Москва, ул. Губкина, дом 3
E-mail: skrutovskiy@gmail.com
Роль в проекте: возглавляет научное направление деятельности НОЦ и осуществляет координацию работы по планированию и проведению научно-образовательной деятельности, реализации мероприятий по поддержке молодых ученых, контролю и согласованию процедур разработки научных программ центра и его подразделений, приему на работу и увольнению сотрудников, формированию доходной и расходной части бюджета, является председателем координационного совета НОЦ.
[Подробнее...](#)

Ректор СФУ
Ваганов Евгений Александрович
академик РАН, доктор биологических наук
E-mail: rector@sfu-kras.ru
Роль в проекте: главный инициатор и организатор создания НОЦ со стороны Сибирского федерального университета, координатор и руководитель научных проектов.
[Подробнее о ректоре...](#)

Директор филиала ФБУ "Рослесозащита"
"Центр защиты леса Красноярского края"
Солдатов Владимир Владимирович
E-mail: soldatov@protect.akadem.ru
Роль в проекте: инициатор и организатор создания НОЦ со стороны "Центра защиты леса Красноярского края", Заведующий базовой кафедрой СФУ при ИФБиТ "Защита и современные технологии мониторинга лесов".
[Подробнее о директоре ИФБиТ...](#)

Проректор по науке и международному сотрудничеству СФУ
Верховец Сергей Владимирович
кандидат экон.-мат.н.
E-mail: ds@sfu-kras.ru
Роль в проекте: осуществляет административную и научную координацию деятельности НОЦ, является членом Координационного совета НОЦ.
[Подробнее о проректоре...](#)

Директор Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ
Сапожников Валентин Алексеевич
кандидат физ.-мат.н.
E-mail: VSapozhnikov@sfu-kras.ru
Роль в проекте: осуществляет административную координацию деятельности НОЦ, является членом Координационного совета НОЦ.
[Подробнее о директоре ИФБиТ...](#)

© 2012 НОЦ «Центр геномных исследований» СФУ
По вопросам редактирования сайта обращаться yulya-pudsteva@rambler.ru

Проблема полногеномного секвенирования с помощью новых секвенаторов:

возможность секвенировать только короткими фрагментами 100-150 нм

Заключение

Основной вклад геномики в изучение лесных популяций:

- разделение популяционной структуры на селективно-нейтральную структуру, вызванную генетическим дрейфом и адаптивную структуру, вызванную естественным отбором
- выявление генов, аллелей и участков генома, ответственных за локальную адаптацию, и, следовательно, важных для сохранения
- более точное установление эффективного размера популяций
- более точное установление демографических событий в истории популяций, вызванных флюктуацией размера, в том числе «bottlenecks» – в отличие от влияния отбора (важно для принятия правильных природоохранных мероприятий)

Заключение

- Полногеномное или целевое (target) секвенирование стали реальностью и наиболее информационным способом генотипирования (genotyping by sequencing - GBS)
- Полногеномное ассоциативное картирование - **эффективный популяционно-геномный подход к обнаружению связи генотипа и фенотипа**
- Геномная селекция должна помочь получению более устойчивых деревьев
- **Хвойные – идеальная система для популяционно-геномного анализа:**
 - гаплоидный мегагаметофит - идеальная система для прямого секвенирования, обнаружения SNP и анализа гаплотипов
 - высокий уровень фенотипической и нуклеотидной изменчивости
 - слабое внутригенное LD
 - возможность клонирования и оценки одного и того же генотипа в разных средах
 - мощная селекционно-производственная инфраструктура

The International Climate-Resilient Crop Genomics Consortium (ICRCGC) <http://www.climatechange-genomics.org>

About :: Climate change genomics - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

About Members Advisory Board Coordinators Links White Paper

Climate change genomics

About

Climate change poses a major challenge for global food security. Climate influences both yield and quality of crop plants. The application of genomics will be a key strategy to tackle this challenge. Development of crop varieties that will be productive in harsh and variable environments will therefore be imperative.

Genomics-based breeding and transgenic approaches result in a better understanding of crop performance in a changing climate while supporting crop improvement programs.

Characterization of available germplasm and exploration of wild crop genetic resources will greatly benefit from the utilization of genomics tools.

Research needs to target appropriate traits, species and regions to achieve optimal impact on food security.

Coordination of international research efforts will be instrumental to better define and faster advance the priority objectives.

The formation of an International Climate-Resilient Crop Genomics Consortium (ICRCGC) is proposed as a forum and network to accomplish this important mission. The ICRCGC currently has a membership list and [an advisory board](#).

We are currently preparing a white paper and we welcome contributions to its sections and subsections. The current draft outline is available [here](#).

If we have missed a link to your site, please contact the [web admin](#)
The site is supported by funds from the [University of Queensland](#) and the [Australian Research Council](#).

The International Climate-Resilient Crop Genomics Consortium (ICRCGC) <http://www.climatechangeagenomics.org/members.php>

About :: Climate change genomics - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

About Members Advisory Board Coordinators Links White Paper

Climate change genomics

Genomics of Climate Resilient Crops

1. Assessment of effects climate change on agriculture with examples from case studies on major crop plants
2. Work done so far on genetics and breeding for climate-resilience traits (CRTs)
3. Rationale for using genomics resources and allied gene pools (AGPs) including wild crop relatives (WCRs) for accelerated breeding for adaptation

Genomics in major crops with the following examples: briefs on classical genetics and traditional breeding for CRTs and genetic mapping and molecular breeding of/for CRTs – information available from genome drafts – structural and functional genomics resources focusing CRTs – libraries, transcriptomics, proteomics, metabolomics – utilization of AGPs – requirement of WGS and genotyping by sequencing of AGPs.

1. Introduction
2. Cereals: Rice, Maize, Wheat, Sorghum, pearl Millet
3. Oilseeds and Pulses: Soybean, Brassicas
4. Pulses: Pigeonpea, Cowpea, Common Bean
5. Vegetables: Tomato, Cucumber, Melon, Water Melon
6. Fruit Crops: Apple, Peach, Grapes, Papaya, Apricot, Almond, Cherry, Plum, Strawberry, blueberry
7. Forest Trees: Eucalyptus, Poplar, Oak, Chestnut, Pine
8. Industrial Crops: Cotton, Cocoa, Sugarcane

Proposed strategies for improvement in CRTs: focus on advanced tools and AGPs

1. Introduction
2. Early and late maturity
3. Drought adaptation
4. Cold tolerance
5. Heat stress tolerance
6. Flooding and submergence tolerance
7. Salinity tolerance
8. Disease resistance
9. Insect resistance
10. Higher nutrient and water use efficiency
11. CO2 sequestration
12. Greenhouse gas emission

Potential for genomic characterization of wild and collected germplasm to enhance global germplasm exchange and use in crop improvement – socio-political and regulatory issues

Education on genomics for plant breeders and plant breeding for genomics

<p>Dr. Olawale Mashood Aliyu Department of Crop Science and Horticulture, University of Nigeria, Nsukka</p>	<p>Dr. Michael Albertson Crop Genetics, Genomics & Breeding Research Division, Institute of Biopropagation, University of Queensland</p>	<p>Dr. Jacqueline Batley School of Agriculture and Food Sciences and Centre of Excellence for Innovative Legume Research, The University of Queensland</p>	<p>Dr. Michael Baum International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria</p>	<p>Prof. Jeff Bennetzen Department of Genetics, University of Georgia</p>	<p>Prof. John Bryant BioScience, U.S. History Laboratory, University of Iowa</p>	<p>Prof. Hong-Wei Cai Japan-Crossbred Agriculture and Foreign Seed Association, Fuzhou Crop Research Institute</p>	<p>Dr. Mehmet Cakir School of Biological Sciences & Biotechnology, Faculty of Science and Engineering, Middle East Technical University</p>	<p>Dr. Jose Crossa Biometrics and Statistics Unit (BSU), CIMMYT</p>	<p>Prof. Christopher Cullis Biotechnology Scholarship Program, Department of Bioproc. Case Western Reserve University</p>
<p>Prof. Modhumita Dasgupta Division of Plant Biotechnology, Institute of Forest Genetics and Tree Breeding</p>	<p>Prof. Ciuro De Pace Department of Agriculture, Forestry, Nature and Energy, University of Turin</p>	<p>Dr. Hannes Dempewolf Global Crop Diversity Trust</p>	<p>A/Prof. Michael Djordjevic Plant Science Division, Research School of Biology, Australian National University, Canberra, Australia</p>	<p>Prof. David Edwards Australian Centre for Plant Functional Genomics, School of Agriculture and Food Sciences, University of Queensland</p>	<p>Prof. Keith Edwards School of Biological Sciences, University of Bristol, Bristol</p>	<p>Prof. Paul Cepts University of California, Riverside, School of Crop and Weed Sciences</p>	<p>Prof. Peter Gresshoff Centre of Excellence, Integrative Legume Research (CILR), The University of Queensland, St. Lucia</p>	<p>Prof. Perry Gustafson Department of Botany, University of Missouri</p>	<p>Prof. Anthony Hall Department of Botany and Plant Science, University of California</p>
<p>Prof. Robert Henry Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation, University of Queensland</p>	<p>Dr. Georgina Hernandez Centro de Genética Genómica - UAM, Ciudad de México</p>	<p>Dr. Abdelbagi Ismail International Rice Research Institute</p>	<p>Dr. Benjamin Kilian Laboratory of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Germany</p>	<p>Prof. Graham King Southern Cross Plant Science, Southern Cross University</p>	<p>Prof. Chittaranjan Kole Project coordinator, Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi</p>	<p>Prof. Kostya Krutovskiy Department of Forest Sciences, University of Georgia</p>	<p>Dr. Zhikang Li Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences</p>	<p>Prof. David Lightfoot Department of Plant, Soil and Environmental Sciences, Southern Cross University</p>	<p>Dr. Nitin Mantri School of Applied Sciences, RMIT University</p>
<p>Dr. Sean Mayes Plant and Crop Sciences, University of Nottingham</p>	<p>Prof. Susan McCouch Department of Plant Breeding & Genetics, Wageningen UR</p>	<p>Prof. Fred Muehlbauer USDA/ARS and Dept. of Crop and Soil Sciences, West Virginia University</p>	<p>Prof. Estivar Nevo International Graduate Center of Evolution, University of Haifa</p>	<p>Prof. Henry Nguyen National Center for Soybean Biotechnology, University of Missouri</p>	<p>Dr. Antonio Oliveira Plant Genomics Center, FAPESP, UFPA, Universidade Federal do Rio de Janeiro</p>	<p>Prof. Rodomiro Ortiz Department of Plant Breeding and Biotechnology, Southern University of Agriculture Sciences</p>	<p>Prof. Andrew Patterson Plant Genomics Group, Laboratory, University of Georgia</p>	<p>Prof. Calvin Qualset Plant Sciences Department, University of California</p>	<p>Prof. Gavin Ramsay Spanish Crop Research Institute</p>
<p>Prof. Luigi Ricciardi Department of Agronomy, Environmental Biology and Chemistry, Genetica and Plant Breeding Unit, University of Bari Aldo Moro</p>	<p>Prof. Loren Rieseberg Biology Department, University of British Columbia</p>	<p>Prof. Bruce Roe Department of Chemistry and Biotechnology Research and Technology Centre, University of Queensland</p>	<p>Prof. Kadambot Siddiquie The JNU Institute of Agriculture, The University of Western Australia, Crawley</p>	<p>Prof. Philipp Simon USDA/ARS, Department of Horticulture, University of Wisconsin</p>	<p>Prof. Mark Sorrells Department of Plant Breeding and Genetics, Cornell University</p>	<p>Prof. MS Swaminathan Swaminathan Research Foundation</p>	<p>Prof. Roberto Tuberosa Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences, University of Padua</p>	<p>Dr. Rajeev Varshney Genetic Resources Centre, National Institute of Agricultural Sciences</p>	<p>Prof. Duncan Vaughan Genetic Resources Centre, National Institute of Agricultural Sciences</p>

Благодарность за финансирование

- **United States Department of Agriculture**
- **National Science Foundation, USA**
- **Western Gulf Forest Tree Improvement Program, USA**
- **Texas Forest Service and Industry Partners, USA**
- **Conifer Translational Genomics Network**
- **Genetics Graduate Program, Texas A&M University**
- **Siberian Federal University**
- **Ministry of Science and Education, Russian Federation**
- **Russian Foundation for Basic Research**
- **Russian Government**

Благодарность соавторам и коллегам

Александр Александрович Онучин
Леонид Иосифович Милютин
Наталья Викторовна Орешкова
Ираида Николаевна Третьякова
Игорь Николаевич Павлов
Елена Николаевна Муратова

Евгений Александрович Ваганов
Сергей Васильевич Первухин
Валентин Алексеевич Сапожников
Сергей Владимирович Верховец
Юлия Андреевна Путинцева

Владимир Владимирович Солдатов
Елена Алексеевна Шилкина
Ирина Владимировна Чубугина
Алексей Александрович Ибе
Ксения Олеговна Дейч

Николай Каземирович Янковский
Дмитрий Владиславович Политов

Dr. Carol Loopstra

Dr. Tom Byram

Dr. David Neale

Dr. Jill Wegrzyn

Dr. Chang Liang
Department of Botany

Dr. Nurul Islam-Faridi
Dr. Dana Nelson
Dr. Craig Echt
Sedley Josserand

Благодарность сотрудникам

Laboratory of Forest Genomics

TAMU Department of Ecosystem Science and Management

Konstantin (Kostya) Krutovsky's Lab - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Konstantin (Kostya) Krutovsky's Lab

treeome.tamu.edu/subpages/krut_lab.html

Most Visited Getting Started Latest Headlines

Home Population Genomics Resources Population Genomics Projects Krutovsky's Lab Links Contact

Lab
Konstantin (Kostya) Krutovsky's Lab

Projects

Population Genetics Course: GENE-612

Dr. Konstantin (Kostya) Krutovsky k-krutovsky@tamu.edu (Principal Investigator)

Dr. Judy Brooks jebrooks@tamu.edu (Research Assistant)

Vikram Chhatre (Graduate Research Assistant)

Tomasz Koralewski tkoral@tamu.edu (Graduate Research Assistant)

Phone: (979) 458-0471

Spring 2008 Seminar series of the Department of Ecosystem Science & Management: RLEM-681

Special Topics in Molecular Ecology: ESSM/MEPS/GENE 689

Personal Webpage

Software

Positions

Dr. Konstantin Krutovsky
Adjunct Professor
k-krutovsky@tamu.edu
(979) 458-1417

Dr. Judy Brooks
Research Assistant
jebrooks@tamu.edu

Xixu Cai
Graduate Student
xixuca@tamu.edu

Dr. Tomasz Koralewski
Former Graduate Student, now Research Associate
tkoral@tamu.edu

Mengmeng Lu
Graduate Student
mira0501@tamu.edu

Dr. Vikram Chhatre
Former Graduate Student
crypticlineage@gmail.com
(now Research Associate at the University of Maryland)

Habibul Islam
Graduate Student
milon237@tamu.edu

Благодарность сотрудникам НОЦ геномных исследований и Лаборатории лесной геномики СФУ

Genome Research and Education Center
Siberian Federal University

Русский

Лаборатория лесной геномики

- Руководитель
- Сотрудники
- Оборудование
- Учебная лаборатория
- Нам помогают
- Партнеры
- Контакты
- СМИ о нас

Сотрудники

- News
- Forest Genomics Lab
- Main
- Leadership
- Staff
- Partners
- Contacts

About us

Genome Res

The Center was established in April 2012 as part of the Center for the Russian Forest Genomics Lab.

the Laboratory of Forest, Siberian Federal University, Krasnoyarsk.

The main objectives

Fundamental research in genomics, bioinformatics, and training of highly qualified scientific and technical personnel.

Development of new technologies and their application in industrial and agricultural sectors.

Development of new technologies and their application in industrial and agricultural sectors.

Development of new technologies and their application in industrial and agricultural sectors.

Development of new technologies and their application in industrial and agricultural sectors.

Development of new technologies and their application in industrial and agricultural sectors.

Development of new technologies and their application in industrial and agricultural sectors.

Development of new technologies and their application in industrial and agricultural sectors.

Центр геномных исследований
Научно-образовательный центр СФУ

English

Новости

Главная

Лаборатория лесной геномики

Руководитель

Сотрудники

Оборудование

Учебная лаборатория

Нам помогают

Партнеры

Контакты

СМИ о нас

Лаборатория лесной геномики

Лаборатория лесной геномики создана в Сибирском федеральном университете в апреле 2014 года в рамках выполнения проекта «Геномные исследования основных бореальных лесобразующих хвойных видов и их наиболее опасных патогенов в Российской Федерации» Правительством РФ в рамках постановления № 220 от 9 апреля 2010 г. «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования».

[Приказ о создании лаборатории](#)

[Положение о лаборатории](#)

Руководитель лаборатории

Круговский Константин Валерьевич

Координатор проекта

Шулепина Светлана Петровна

Сотрудники лаборатории

© 2012 НОЦ «Центр геномных исследований» СФУ

По вопросам редактирования сайта обращаться yuliya-putintseva@rambler.ru

в.н.с., к.б.н. Наталья Орешкова, ответственная за подготовку и секвенирование

к.с. Юлия Путинцева, ответственная за обработку данных секвенирования

д.б.н., в.н.с. Павел Игорь, ответственный за направление фитопатологии

к.б.н. Сукачева Ирина

к.т.н. Дмитрий Кузьмин (ВТК), ответственный за вычислительный кластер

к.б.н. Елена Шилова (ВТК), ответственная за разработку образовательных курсов

н.с., к.с.-т.н. Алексей Ибе, подготовка

н.с. Ксения Дайч, подготовка

Шеллер Марина (ВТК), разработка образовательных курсов

Юшкова Татьяна (ВТК), фитопатология

http://genome.sfu-kras.ru/en/forest_genomics

Центр геномных исследований
Научно-образовательный центр (ФУ)

- Новости
- Главная
- Лаборатория лесной геномики
- Учебная лаборатория
- Нам помогают
- Партнеры
- Контакты
- СМИ о нас

Главная

Научно-образовательный центр геномных исследований

Центр создан в апреле федерального университета защиты леса Красноярск им. В. Н. Сукачев

Основными задачами

1. Проведение ФУ молекулярной Б
2. Обеспечение педагогических научно-образовательной инновационной
3. Разработка теор образовани.
4. Развитие новых технического со технологически другими структу технических и о
5. Разработка выс молекулярной Б
6. Развитие между заведениями и г мировой систем
7. Развитие финан внебюджетных с

Центр располагает самым в мире оборуд генетических и геном наиболее мощный секс (США). В настоящее вр аналогичным оборудо российскими и зарубе

Проекты Центра

Основным проектом Ц сибирской лиственницы борельных лесов Сиб уникальны по размеру изучения. Инновацион

Благодарность сотрудникам СФУ, Центра лесозащиты, НОЦ геномных исследований и Лаборатории лесной геномики СФУ

http://genome.sfu-kras.ru/en/forest_genomics

- **20-ый век:**

**Эволюционное учение + Генетика
= Синтетическая теория эволюции
(Генетическая теория эволюции или
Эволюционная генетика)**

популяционный уровень мышления

**Феодосий Добжанский
(1900-1975)**

- **21-ый век:**

**Молекулярная генетика + Биоинформатика =
Геномика**

популяционно-геномный уровень мышления

**Крутовский К. В. От популяционной генетики к популяционной геномике лесных древесных видов:
Интегрированный популяционно-геномный подход // Генетика. 2006. Т. 42. №10. С. 1304–1318.**

Спасибо за внимание!

Желающие участвовать в работе центра обращайтесь к Орешковой Наталье Викторовне (пробоподготовка и секвенирование, oreshkova@ksc.krasn.ru) и Юлии Андреевне Путинцевой (биоинформатика, yuliya-putintseva@rambler.ru)
<http://genome.sfu-kras.ru>